

Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai sinimailasta sisältävistä nurmista ja niiden suojaviljoista, vilja-herneseosviljoista, apila- ja sinimailasviljelyksiltä, palkokasvi-, avomaankurkku-, pellava-, istukas- ja taimisipuli- sekä mäkikuismaviljelyksiltä

- Hellävarainen ratkaisu monille viljelykasveille
- Raemainen valmiste, jonka annostelu on helppoa

**Avainominaisuudet:**

Basagran SG on kosketusvaikutteinen lehtien kautta tehoava valmiste. Parhaiten se tehoaa siemenrikkakasvien taimiin sirkkalehtiasteelta 2-3 -lehtiasteelle saakka. Teho on hyvä mm. saunakukkaan, peltomataraan, pihatähtimöön sekä ristikkukaisiin rikkakasveihin. Teho savikkaan ja pillikkeisiin vaihtelee.

Käyttökohteet	Käyttöajankohta	Käyttömäärä
<b>Apila- ja sinimailasviljelykset suojaviljan kanssa tai ilman kylövuonna</b>	Apilassa tai sinimailasessa on sirkkalehtien lisäksi 1-3 kasvulehteä tai, kun heinän oras on 2-3-lehtiasteella	1,1-1,7 kg/ha*
<b>Apilan siemenviljelykset ja apilaa tai sinimailasta sisältävät nurmet</b>	Aikaisin keväällä kasvun alettua	1,1-1,7 kg/ha
<b>Sinimailasen siemenviljelykset</b>	Aikaisin keväällä kasvun alettua	1,4-1,7 kg/ha
<b>Vilja-herne-seosvilja</b>	Vilja on 2-3-lehtivaiheessa	1,1-1,7 kg/ha
<b>Herne, myös palkoineen korjattava</b>	Herne 5-8 cm	1,1-1,7 kg/ha
<b>Härkäpapu</b>	Aikaisella taimiasteella, 2-4 kasvulehteä	1,1-1,7 kg/ha
<b>Pensasapapu</b>	Pensasapavussa 2 kasvulehteä	1,1-1,7 kg/ha
<b>Istukas- ja taimisipuli</b>	Sipulin 3-4-lehtivaiheessa, ei sovellu varhaisviljelyyn	1,1 kg/ha
<b>Avomaankurkku</b>	Taimessa on 1-2 kasvulehteä, tavallisesti 3-4 viikkoa kylvöstä, vasta 5-7 vrk harson poistamisen jälkeen	1,4-1,7 kg/ha
<b>Pellava</b>	Pellavan taimien ollessa 5-6 cm	1,4-1,7 kg/ha + kiinnite 0,2 l/ha
<b>Mäkikuisma</b>	Kylvö- tai istutuskesänä, sen ollessa vähintään 3 cm	1,1-1,4 kg/ha

\* sinimailasviljelykset ilman suojaviljaa kylövuonna 1,4-1,7 kg/ha

**Vaikutustapa:** Bentatsonin vaikuttaa kosketusvaikutteisesti lehtien kautta

**HRAC:n luokitus:**

Bentatsoni kuuluu ryhmään C3 (yhteyttämisen esto, fotosysteemi 2)

**Huomioitavaa:**

Valmiste on kosketusvaikutteinen, on tärkeää käyttää korkeaa vesimäärää. Paras teho saadaan kostealla ja lämpimällä säällä +15°C. Tasaiset olosuhteet ennen ja jälkeen ruiskutuksen edistävät sitä. Jos päivälämpötila > +20°C, ruiskuta aamulla tai illalla. Älä ruiskuta kirkaalla auringonpaisteella. Kuivissa oloissa erityisesti jauhosavikan torjuntaa tehostaa Sunoco-öljyn lisääminen, sen ohjeiden mukaan. Jos öljyä lisätään muita valmisteita ei saa sekoittaa.

Heinän ja puna-apilan suojaviljoilla voidaan Basagran SG valmisteen tehoa varmistaa lisäämällä joukkoon MCPA:ta 0,5 l/ha ja herneellä 0,4 l/ha.

Älä sekoita insektisidien kanssa. Härkä- ja pensaspapua tai avomaankurkkua ei saa ruiskuttaa auringonpaisteessa. Vaikutus rikkoihin alkaa näkyä n. 1 vk:n kuluttua. Yöhallan uhatessa ja sen jälkeen ei saa ruiskuttaa.

**Vesimäärä:** 300-400 l/ha

**Sateenkesto:** väh. 6 h

**Varoika:** Ei määritelty

**Käytön rajoitukset:** Ei saa levittää reppuruiskulla. Vaarallista muille viljelykasveille, myös virnoille.

**Peräkkäiskäyttörajoitus:** Ei peräkkäisten vuosien käyttörajoitusta.

**Pohjavesirajoitus:** Kyllä.

Ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialuekat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää

**Vesistöetäisyysrajoitukset:**

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuuttimet	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Kaikki kasvit	5 m	3 m	3 m	3 m

**Kasvinviljelyrajoitukset:** Ei tiedossa olevia rajoituksia.

**Tuoteominaisuudet:**

- Tehoaine: Bentatsoni 870 g/kg
- Olomuoto: Raemainen
- Varastointi: Säilytettävä kuivassa
- Pakkauskoko: 3 kg / 4 kpl
- Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät
- Valmistaja: BASF