

Valmiste kasvitautien torjuntaan omenalla, mansikalla, herukoilla ja karviaisella sekä kasviuonekoristekasveilla.

- Monipuolinen strobiluriini erikoiskasvien tauteihin
- Hedelmäruven, härmän ja ruusun mustalaikun torjuntaan
- Ohjelmiin mm. Delanin ja Scalan kanssa

Avainominaisuudet:

Kasvitautien torjuntaan omenalla, mansikalla, herukoilla ja karviaisella sekä kasviuonekoristekasveilla. Tehokas ratkaisu mm. hedelmäruven ja härmien torjuntaan, paras teho saadaan suojaavana ruiskutuksena. Strobiluriinityyppisen tehoaineen kanssa on hyvä kiinnittää huomiota ruiskutusohjelmissa erityisesti resistenssien hallintaan.

Käyttömäärät:

Käyttökohteet	Käyttöajankohta	Käyttömäärä
Omenan ja päärynän hedelmäruvi sekä härmä	Käsittelyaika (BBCH 07/53-81) silmujen puhkeamisesta hedelmien kypsymisen alkuun ja aikaan, jolloin hedelmät alkavat saada lajikekohtaisen värinsä. Enimmäisannos käsittelykertaa kohti on 0,2 kg/ha. Enintään 3 käsittelyä kasvukauden aikana kasvustoa kohti. Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena. Käsittelyjen vähimmäisväli on 7 päivää. Tautipaineen ollessa suuri ei käsittelyjen väli tule ylittää 7-10 päivää. Vesimäärä 800–2000 l/ha	0,2 kg/ha
Mansikan härmä avomaalla, kasviuoneessa ja tunnelissa viljellyt mansikat	Käsittelyaika (BBCH 11-89) ensimmäisten lehtien kehittymisestä alkaen aina toiseen satoon saakka. Enimmäisannos käsittelykertaa kohti on 0,2 kg/ha. Enintään 2 käsittelyä kasvukauden aikana kasvustoa kohti. Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena. Käsittelyjen vähimmäisväli on 7 päivää. Vesimäärä 400-1500 l/ha.	0,2 kg/ha
Herukan, karviaisen, mustikan ja karpalon härmä	Käsittelyaika (BBCH 01/51-85) silmujen turpoamisvaiheesta aina täyden kypsymisen alkuun saakka. Enimmäisannos käsittelykertaa kohti on 0,2 kg/ha. Enintään 2 käsittelyä kasvukauden aikana kasvustoa kohti. Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena. Käsittelyjen vähimmäisväli on 7 päivää. Vesimäärä 1000 l/ha.	0,2 kg/ha
Ruusun härmä ja mustalaikku	Käsittelyaika (BBCH 11-89) ensimmäisten lehtien kehittymisestä aina marjojen täyteen kehitykseen saakka (ennen lehtien vanhentumisesta johtuvaan värjäytymiseen). Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena. Ruiskutusväli on 7 – 14 päivää tautipaineesta riippuen	0,006–0,02 % (0,6–2g 10 l vettä)
Krysanteemin ruoste	Käsittelyaika (BBCH 11-89) ensimmäisten lehtien kehittymisestä aina marjojen täyteen kehitykseen saakka (ennen lehtien vanhentumisesta johtuvaan värjäytymiseen). Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena. Ruiskutusväli on 7 – 14 päivää tautipaineesta riippuen	0,006–0,02 % (0,6–2g 10 l vettä)

Vaikutustapa: Kresoksiimimetyyli vaikuttaa ”pinta systeemisesti” kasvinosassa.

FRAC:n luokitus:

Tehoaine kuuluu ryhmään 11 (QoI-fungisidit)

Huomioitavaa:

Koristekasveilla tulee tehdä esikoe, koska eri lajikkeiden kestävyys voi vaihdella. Mahdollisten kestävien homesienikantojen esiintymistä ei voida täysin sulkea pois. Valmisteeilla ei ole tehoa tällaisten sienikantojen torjunnassa.

Vesimäärä: Vesimäärät ilmoitettu käyttömäärä taulukossa kasvilajeittain.

Sateenkesto: 1 h

Varo aika: Mansikalla 7 vrk. Herukoilla, karviaisella, mustikalla ja karpalolla 14 vrk. Omenalla ja päärynällä 28 vrk. Kasviuoneviljelyssä työhygieeninen varo aika 12 tuntia.

Käytön rajoitukset:

Valmistetta saa käyttää mansikka-, karviais-, mustikka-, karpalo- ja herukkaviljelmällä enintään kaksi kertaa sekä omenalla, päärynällä, ruusulla ja krysanteemilla kasviuoneessa kolme kertaa kasvukauden aikana.

Herukka- ja karviaispensaita ei saa ennen sadonkorjuuta käsitellä myöhemmin kuin viikko kukinnan päättymisestä.

Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei peräkkäisten vuosien käyttörajoitusta.

Pohjavesirajoitus: Kyllä.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Vesistöetäisyysrajoitukset:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuuttimet	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Mansikka, koristekasvit avomaalla	3 m	3 m	3 m	3 m
Marjapensaat	10 m	5 m	3 m	3 m
Hedelmäpuut	25 m	20 m	15 m	5 m

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei ole.

Tuoteominaisuudet:

- Tehoaine: Kresoksiimimetyyli 500 g/kg
- Olomuoto: Vesiliukoinen rae
- Varastointi: Säilytettävä kuivassa
- Pakkauskoko: 0,5 kg / 10 kpl
- Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät
- Valmistaja: BASF