

Edullinen kasvunsäade vehnälle, kauralle, rukiille, ruisvehnälle ja heinän siemenviljelyksille aikaisessa vaiheessa

We create chemistry

- Lyhentää ja vahvistaa alimpia solmuvälejä
- Parantaa pensomista aikaisessa käytössä
- Tehostaa juuriston kehitystä
- Edullinen kasvunsäade

Avainominaisuudet:

Cycocele 750 on edullinen korrensäade vehnälle, kauralle, rukiille ja koristekasveille. Lyhentää ja vahvistaa alimpia solmuvälejä sekä tehostaa juuriston kehitystä. Käyttömäärä tarkennetaan lannoituksen ja lajikkeen mukaan. Viljat voidaan ruiskuttaa joko yhdessä rikkakasviaineen kanssa pensomisen lopulla tai viljan 1-solmuasteella. Aikainen käsittely lisää versontaa. Paras laonesto-vaikutus saadaan ruiskutettaessa 1-solmuasteella. Optimiruiskutusolosuhteet ovat +15-20°C ilman suhteellisen kosteuden ollessa suuri.

Käyttökohteet	Käyttöajankohta	Käyttömäärä
Syysvehnä	Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste)	1,0-1,5 l/ha
Kevätvehnä	Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste)	0,3-1,0 l/ha
Ruisvehnä	Pensomisen loppu-korrenkasvun alku (1-solmuaste)	1 l/ha
Ruis	Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste)	1,0-1,5* l/ha
Kaura	Pensomisen loppu-korrenkasvun alku (1-solmuaste)	1,0-1,5* l/ha
Siemennurmi	Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste)	2,0 l/ha

*=Rukiin ja kauran käsittelyssä ruiskutusnesteeseen voidaan lisätä kiinnitettä 0,3-0,5 l/ha, mikäli valmistetta ei ruiskuteta seoksena jonkun muun aineen kanssa.

Vaikutustapa: Klormekvattikloridi vaikuttaa systeemisesti kasvin vihreiden osien kautta.

Huomioitavaa: Heikossa kasvukunnossa olevaa tai poudanaralla maalla kasvavaa kasvustoa ei saa ruiskuttaa.

Vesimäärä: 200-400 l/ha

Sateenkesto: 3-4 h

Varo aika: Syysviljat on ruiskutettava ennen kesäkuun alkua ja kevätiljat ennen heinäkuun alkua (yleensä 25.6. mennessä).

Käytön rajoitukset:

Siemeneksi viljeltävien nurmikasvien korsia ei saa käyttää eläinten rehuksi ja sienten kasvualustaksi. Viljan olkia ei saa käyttää lypsykarjan rehuksi ja sienten kasvualustaksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta. Jos käsitelty kasvusto joudutaan rikkomaan ja viljelylohko kylvetään uudelleen, niin salaattia, apilaa ja auringonkukkaa saa kylvää aikaisintaan kahdeksan viikon kuluttua käsittelystä voitusten estämiseksi.

Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei peräkkäisten vuosien käyttörajoitusta

Pohjavesirajoitus: Ei pohjavesirajoitusta

Vesistöetäisyysrajoitukset:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuuttimet	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Kaikki kasvit	3 m	3 m	3 m	3 m

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei tiedossa olevia rajoituksia.

Tuoteominaisuudet:

- Tehoaine: Klormekvattikloridi 750 g/l
- Olomuoto: Vesiliukoinen konsentraatti (SL)
- Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl
- Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät
- Valmistaja: BASF