

# PICTOR ACTIVE®

Uusi SDHI sukupolven tehokas ratkaisu öljykasvien kasvitautien torjuntaan, tehoa joka näkyy!

- Tehokas erityisesti pahimpiin öljykasvien tauteihin pahkahome ja laikkutauti
- Joustava käyttöä
- Vähentää siementen varisemisriskiä
- Vahvistaa kasvin stressinsietokykyä
- Sivuvaikutuksena tehoa kuivamätään ja lehtihomeeseen

## Avainominaisuudet:

Pictor Active on suunniteltu tuomaan tehoa öljykasvien kasvitautien torjuntaan. Siinä ollaan saatu yhdistettyä SDHI tehoaineryhmän boskalidi ja Comet Prosta tuttu pyraklostrobiini, jotka yhdessä nostavat öljykasvien tautitorjunnan uudelle tasolle. Pictor Active antaa tehokkaan suojan pahkahometta ja laikkutautia vastaan. Sivuvaikutuksena saadaan tehoa lehtihomeeseen ja kuivamätään. Valmisteella saadaan kasville lisäksi positiivisia fysiologisia vaikutuksia, kuten parantunut kuivuuden kesto, siementen varisemisriskin sekä pakkotuleentumisriskin pieneminen. Näin ollen kasvusto on elinvoimaisempi, jolloin sen satopotentiaalista saadaan mahdollisimman paljon irti. Pictor Active on joustava käyttää kukinnan alusta kukinnan loppuun myös jaettu käsittely on mahdollinen. Optimaalinen teho pahkahometta vastaan saadaan täydenkukinnan aikaisella käsittelyllä BBCH 65.

Käyttökohteet	Käyttöajankohta / kasvuaste BBCH	Käyttömäärä
Kevättrypsi ja -rapsi, syysrapsi	Kukinnan alku – kukinnan loppu, BBCH 60-69 tai jaettu käsittely	0,6-1,0 l/ha 2 x 0,5 l/ha

## Vaikutustapa:

Pictor Active yhdistää kahden tehoaineen translaminaarisen ja systeemisen ominaisuuden. Boskalidi imeytyy nopeasti kasviin ruiskutuksen jälkeen. Boskalidi on systeeminen ja se leviää translaminaarisesti lehtien läpi vastakkaiselle puolelle ja kulkeutuu lehtien nestevirtauksen mukana lehtien kärkiä kohti. Näin myös ruiskuttamaton lehtipinta suojataan. Pyraklostrobiini liikkuu kasvissa paikallissysteemisesti suojaten koko lehden. Se puhdistaa alkavan tautisaastunnon sekä estää pitkään uusien tautien puhkeamisen.

## FRAC:n luokitus:

Boskalidi kuuluu ryhmään 7 (SDHI-ryhmä) ja pyraklostrobiini kuuluu ryhmään 11 (QoI-fungisidit)

## Huomioitavaa:

Optimaalinen käsittely ajankohta on kertakäsittelyssä täyden kukinnan aikaan. Rekisteröinti mahdollistaa myös jaetun käsittelyn hyödyntämisen.

**Vesimäärä:** 100 – 400 l/ha

**Sateenkesto:** 3 h

**Varoika:** Määritetään rekisteröinnin yhteydessä

**Käytön rajoitukset:** Jaetun käsittelyn tekeminen on mahdollista, mutta kokonaiskäyttömäärä ei saa ylittää 1 l/ha kasvukaudessa. Ruiskutusten välin on oltava 7- 21 päivää.

**Peräkkäiskäyttörajoitus:** Ei peräkkäiskäyttörajoitusta

**Pohjavesirajoitus:** Ei pohjavesirajoitusta

## Vesistöetäisyysrajoitukset:

Käyttökohteet	Viuhkasuuttimet	Suutintyyppi		
		Tuulikulkeumaa vähentävä suutin		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Kevättrypsi ja -rapsi	15 m	5 m	5 m	3 m
Syysrapsi ja -rapsi	15 m	10 m	5 m	3 m

**Kasvinviljelyrajoitukset:** Ei rajoituksia

## Tuoteominaisuudet:

- Tehoaineet: Boskalidi 150 g/l ja Pyraklostrobiini 250 g/l
- Olomuoto: Suspensiokonsentraatti
- Pakkauskoko / tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl
- Valmistaja: BASF