

# Comet® Pro



Kasvitautien torjunta-aine



Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

5 L

We create chemistry



**Käyttötarkoitus:**

Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla sekä ruskolaikun, syysvehnänharmaaikaikuttaudin ja vehnänlehtilaikaikuttaudin (*Drechslera tritici-repentis*) torjuntaan sys- ja kevätevhnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä härmän, *Ramularia* -sienen ja *Cercospora* -laikkauttisenen torjuntaan sokerijuurikalla. Noudata käyttöohjeita ihmisiille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**Käytön rajoitukset:**

Varoaka viljoilla 35 vrk, sokerijuurikalla 30 vrk. Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiai tuotteella tai sen pakkausella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetaisydyt vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)		
		50 % vähenrys	75 % vähenrys	90 % vähenrys
viljat, sokerijuurikas	Ei sallittu	20 m	10 m	5 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivulta [www.tukes.fi](http://www.tukes.fi)/vesistorajitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Traktoriruiskun täytöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Valmiste on myrkkylistä lieroille.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojueluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteesseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

**Suojaainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojaapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä käsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen-/silmiensuojaista ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojaista varustettuna P2/A2 suodattimella.

**Käyttöohje:**

Viljakasvusto ruiskutetaan ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä. Käyttöaika on tautitilanteen mukaan pensomisen lopulta tähkälletulovaheeseen (BBCH 26 – 61), viimeistään kukinnan alkamisvaiheeseen.

Ohralla käsitteily tehdään yleensä korrenkasvun aikana, tavallisesti lippulehtivaiheessa.

Syys- ja kevätehnykästä härmää torjutaan pensomisen lopulta tähkälletulovaheeseen saakka taudin esiintymisestä riippuen. Laikkutautien paras torjunta-aika on yleensä tähkälletulovaheessa.

Ruis ja ruisvehnä ruiskutetaan tautien esiintymisen alkuvaiheessa korrenkasvun aikana.

Kaura ruiskutetaan korrenkasvun aikana, viimeistään ennen kukintaa.

**Käyttömääräät viljoilla:**

Käyttömääräät vaihtelevat 0,3 – 1,2 l/ha Comet Pro -valmistetta. Resistenssin ehkäisemiseksi valmistetta käytetään viljoilla aina seoksesta muun typpisen valmisteesta (esim. Juventus 90, Sportak 45 EW tai Tilt 250 EC) kanssa.

Syys- ja kevätehnyllä syysvehnänharmaalaikkuja ja ruscolaikkuja, ruosteita vehnän lehtilaikkuja torjuttaessa kertaruiskutuksesta 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90 tai Sportak EW 0,5 l/ha kasvuvaheessa 37 – 55. Jaetuissa 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90 tai Sportak EW 0,5 l/ha ( tai muu vastaava) kasvuvaheessa 32-39 sekä tarvittaessa uusintakäsitteily kasvuvaheessa 49 – 59.

Rukiilla rengaslaikun ja ruskearuosteenvaheessa 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90 tai Sportak EW 0,5 l/ha kasvuvaheessa 37–55. Kovassa tautipaineessa valitaan korkeampi käyttömäärä.

Ohralla rengaslaikkuja, verkkolaikkuja ja ruosteita torjuttaessa 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90 tai Sportak EW 0,5 l/ha kasvuvaheessa 37 – 49. Kovassa tautipaineessa valitaan korkeampi käyttömäärä.

Kauralla ruosteita ja lehtilaikkuja torjuttaessa 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90, 0,5 l tai Sportak EW 0,5 l/ha kasvuvaheessa 32 – 55. Kovassa tautipaineessa valitaan korkeampi käyttömäärä.

Suurin sallittu käyttömäärä on 1,2 l/ha Comet Pro -valmistetta kasvukautta kohti. Vesimäärä on 150 – 300 l/ha.

**Sokerijuurikkaalla** käyttömäärä on kertakäsitteilyssä 0,6 – 1,2 l/ha elokuun alussa tai jaetuissa käsitteilyssä 0,6 l Comet Pro elokuun alussa, uusintaruiskutus 0,6 l/ha n. 2 – 3 viikkoja myöhempin. Comet Pro -valmisteen kokonaismäärä ei saa kasvukaudessa ylittää 1,2 l/ha.

**Suositus käsitteily suorittamiseksi:**

Ruiskuta heti näkyvien oireiden, laikkujen, ilmestyessä kasvustoon, yleensä elokuun ensimmäisellä puoliskolla. Voimakkaassa tautipaineessa ja herkiliä lajikkeilla suosittelallaan uusintaruiskutuksen suorittamista syyskuun alkupuolella. Ruiskutuksen aikana kasvuston on oltava hyvässä kasvukunnossa. Äriolioluhteita kuten kuivia oloja ja ruiskutusta voimakkaassa auringonpaisteessa tulee välttää.

**Huomautukset:**

Comet Pro'n käytöllä saattaa olla myös sadon määrä ja laatauva parantava vaikutus, vaikka kasvustossa ei havaittaisi siementä.

Voidaan ruiskuttaa tankkiseoksesta Juventus 90, Sportak EW, Tilt 250 EC, Kestac 50/Fastac 50 -valmisteiden kanssa.

Ravistettava ennen käyttöä. Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään sekoituspumpun käydessä. Ruiskutettaessa käytetään viuhkasuuttimia, noin kolmen baarin painetta ja 6 km/h ajonopeutta.

Älä ruiskuta kosteana kasvustoon.

Suojattava pakkaselä.

Varastointikestävyys: Varastointiaika: 60 kk

### **Resistenssi:**

Pohjois-Euroopassa vehnän härmä on kehittänyt laajalla alueella strobiluriini-valmisteita vastaan. Ohran härmä sekä sysvehnän (*Septoria tritici*) ovat myös alkaneet osoittaa kestävyyttä. Suomessa ei vielä ole ollut ongelma. Vuonna 2005 otetut kasvustonäytteet eivät osoittaneet resistenssiä sysvehnänharmaaläikkulla (*Septoria tritici*). Kasvinsuojeluaineesta kestävyyden (resistenssin) seurauksena on, että teho menetetään joko osittain tai kokonaan. Jotta kestävyyys ei levääisi ja jotta paras mahdollinen teho varmistettaisiin, on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita käytettäessä strobiluriini-valmisteita viljalla:

1. Käytä Comet Pro:ta tai muita strobiluriini -valmisteita korkeintaan kaksi kasvukaudessa.
2. Käytä Comet Pro:ta ennaltaehkäisevästi tai viimeistään taudin alkuvaiheessa.
3. Käytä Comet Pro:ta seoksesta muulla tavalla vaikuttavien tautien tarkoitetujen valmisteiden kanssa (esim. Juventus 90, Sportak 45 EW, Tilt 250 EC), jotka tehoavat torjuttavaan tautiin.
4. Annostelee Comet Pro ja muut sekoitettavat valmisteet ohjeiden mukaan. Monien tuotteiden osalta on olemassa yleinen riski, että vaikuttavia aineita vastaan kehittyy vastustuskyky. Tästä syystä vaikutuksen muuttumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. On mahdotonta yleisesti varmuudella ennustaa, miten vastustuskyky mahdollisesti kehittyy, sillä tähän voidaan vaikuttaa monin tavoin aina viljelykasvin ja käyttötövän mukaan. Siksi emme vastaa vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu tällaisesta kehittyvästä vastustuskyvystä. Vaikutuksen vähentämisen minimoimiseksi BASF:n suosittelemaa annostusmääriä tulisi aina noudattaa.

### **Ensiapu**

Sairaanhoitohenkilöstön on huomioitava oma turvallisuutensa. Jos potilas alkaa olla tajuttomuuden tilassa, on hänet asetettava kylkiassetoon. Riisu saastuneet vaatteet. Jos ongelmia esiintyy: Hakeudu lääkärin hoitoon. Näytä lääkärille pakkaus, etiketti ja/tai tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Vältä iho-, silmä- ja vaatekosketukset valmisteeseen.

Jos tuotetta on hengityt: Lepää, varmista raittiin ilman saanti, hakeudu lääkäriin.

Ihokosketus: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos tuotetta on joutunut silmiin: Huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan juoksevalla vedellä, luomet avoimena.

Tuotteen nieleminen: Huuhtele suu välittömästi ja juo sen jälkeen 200 – 300 ml vettä, hakeudu lääkäriin. Oireet: Tärkeimmät tunnetut oireet ja vaikutukset selostetaan käyttöturvallisuustiedotteessa. Muita tärkeitä oireita tai vaikuttoksia ei vielä tunneta.

Hoito: hoida oireiden mukaan (puhdistus, tärkeät elintoiminnot), tunnetaan vasta-ainetta ei ole.

### **Yleistä**

Lukuiset, erityisesti alueelliset tai alueellisesti selittiyvät, tekijät voivat vaikuttaa tuotteen tehoon. Tällaisia tekijöitä ovat mm. säälot ja maaperä, viljelykasvien eri lajikkeet, vuoroviljely, ruiskutusajat, käytettävät määrät, sekoitumisen muihin tuotteisiin, tehoaineille vastustuskyvisten organismien ilmaantuminen ja ruiskutusmenetelmät. Tiettyjen olojen vallitessa tehon muuttumisen tai kasvien vahingoittumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Valmistaja tai tavarantoimittaja eivät tällaisissa oloissa ole missään vastuussa mahdollisista vahingoista.

Elinartikeliturvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 3.3.2010.

**Bruksändamål:**

För bekämpning av svampsjukdomar som främjar mjöldagg, rostsjukdomar och grödans vissnade i alla stråsädeslägg. För bekämpning av brunfläcksjuka, höstvetens svartpricksjuka (*Septoria tritici*) och vetets bladfläcksjuka (*Drechslera tritici-repentis*) i höst- och vårvete. För bekämpning av sköldfläcksjuka och bladfläcksjuka i korn, havrens bladfläcksjuka i havre och vid sköldfläcksjuka i råg och rågvete. I sockerbeta mot mjöldagg, ramularia och cercospora. Följ bruksanvisningarna för undvikande av fara för mänskor och miljön.

**Användningsbegränsningar:**

Karenstid i stråsäd 35 dygn i sockerbeta 30 dygn. Preparatet får inte användas i stråsäd efter påbörjad blomning.

**Förebyggande av skador på miljön:**

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Bruksändamål	Munstycktyp			
	Spaltpidarmunstycke	Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken 1)		
		50 % reduktion	75 % reduktion	90 % reduktion
Stråsäd, sockerbeta	Inte tillåtna	20 m	10 m	5 m

1) Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida [www.tukes.fi/vattendragsbegrensning](http://www.tukes.fi/vattendragsbegrensning). Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycknen.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Giftig för daggmaskar.

Överblivet, oanväntbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

**Skyddsutrustning:**

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshanskars (t.ex. nitril) och huvudbonad användas. Om inandning är möjligt, måste andningsskydd försedd med kombinationsfilter (P2/A2) användas.

**Bruksanvisning, stråsäd:**

Besprutningen utförs i stråsäd då de första sjukdomsfläckarna har blivit synliga. Behandlingstiden är beroende på smitttrycket från slutet av bestockningen fram till begynnande blomning (utvecklingsstadie 26 – 61).

**Korn:** I korn utförs bekämpningen vanligtvis under stråskjutningen, vanligen vid flaggbladsstadiet.

**Höst- och vårvete:** Mjöldagg bekämpas från slutet av bestockningen fram till axgången beroende av sjukdomens uppträdande. Den bästa tidpunkten för bekämpning är vanligen vid axgången.

**Råg och rågvete:** I början av sjukdom under stråskjutningen.

**Havre:** Bekämpningen utförs under stråskjutningen, senast före blomning.

### **Bruksmängden i stråsäd:**

Bruksmängderna är 0,3 – 1,2 l/ha Comet Pro. Bruksmängden väljs beroende på smittotryck. För att undvika resistens skall Comet Pro blandas med produkt med annat verkningsätt (exempel Juventus 90 och Sportak EW, Tilt 250 EC).

I höst -och vårvete vid bekämpning av svartpricksjuka, rotsjukdomar och vetets bladfläcksjuka vid engångsbehandling 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90 eller Sportak EW 0,5 l/ha i växtstadierna 37 – 55. Vid delad behandling 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + Juventus 90 0,5 l eller 0,5 l/ha Sportak EW (eller annat motsvarande) i växtstadierna 32 – 39 och vid behov upprepa behandling i stadium 49 – 59.

I råg vid bekämpning av sköldfläcksjuka och brunrost 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90 eller 0,5 l/ha Sportak EW, växtstadierna 37 – 55. Då sjukdomstrycket är hårt ska den högre bruksmängden väljas.

I korn vid bekämpning av sköldfläcksjuka och bladfläcksjuka och rotsjukdomar 0,3 – 0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90 eller 0,5 l/ha Sportak EW, växtstadierna 37 – 49. Då sjukdomstrycket är hårt ska den högre bruksmängden väljas.

I havre vid bekämpning av rotsjukdomar och bladfläcksjukdomar 0,3-0,6 l/ha Comet Pro + 0,5 l Juventus 90 eller 0,5 l/ha Sportak EW, växtstadierna 32 – 55. Då sjukdomstrycket är hårt ska den högre bruksmängden väljas.

Största tillåtna bruksmängd är 1,2 l/ha Comet Pro per växtperiod.

Vattenmängd: 150 – 300 l/ha.

### **Sockerbeta:**

Bruksmängden vid engångsbehandling är 0,6 – 1,2 l/ha i början av augusti eller vid delad giv 0,6 l Comet Pro i början av augusti upprepa behandlingen ca 2 – 3 veckor senare med 0,6 l/ha. Totala bruksmängden under växtpérioden av Comet Pro får ej överstiga 1,2 l/ha.

### **Behandlingsrekommendation:**

Bespruta så snart synliga symptom (fläckar) är synliga, vanligtvis första halvan av augusti. Vid starka angrepp i känsliga sorter rekommenderas en upprepning av behandlingen i början av september.

Behandling skall bara utföras i fält i god tillväxt och inte under extrema väderlekssituationer (torkstress, starkt solsken).

### **Anmärkningar:**

Comet Pro kan också ge en kvalitets och kvantitets höjande effekt av skörden utan att svampsjukdomar har konstaterats i grödan. Preparatet kan blandas och besprutas i spannmål tillsammans Sportak EW, Tilt 250 EC, Juventus 90, Fastac/Kestac.

Omskakas före användning. Sprutans behållare fylls först till hälften med vatten varefter preparatet tillsätts medan blandning pågår. Vid besprutning används spaltspridarmunstycken, ca tre bars tryck och 6 km/h körhastighet.

Preparatet bör inte sprutas i fuktig grödan.

Skyddas mot frost.

Lagringsstabilitet/lagringstid: 60 månader

### **Resistens:**

I Norra Europa det finns för närvarande utbredd strobilurinresistent mjöldagg i vete och begynnande utbredning av strobilurinresistent mjöldagg i korn samt svartpricksjuka (*Septoria tritici*) i vete.

Tillsvidare finns det inte resistens i Finland. Man samlade prover från vete sommaren 2005 men det fanns ingen resistens i dessa mot svartpricksjuka. Resistens orsakar dålig eller bristande effekt och för att undvika ytterligare spridning av denna resistens, samt för att säkra bästa möjliga effekt, är det viktigt att följa nedan angivna riktlinjerna för användning av strobiluriner i stråsäd, dvs:

1. Spruta Comet Pro eller annan produkt som innehåller strobilurin högst två gånger under samma växtperiod.
2. Det lönar sig att spruta Comet Pro i förebyggande syfte eller så tidigt som möjligt i början av sjukdomsinfektionen.
3. Comet Pro bör sprutas i blandning med medel en annan typ (till exempel Juventus 90, Sportak EW och Tilt), vilka har ett annat verkningsmått.
4. Använd alltid en tillräcklig mängd preparat, d.v.s. följ alltid bruksanvisningar.

I fråga om många produkter finns det en allmän risk för att resistens mot verksamma beständsdelar utvecklas. Därför kan möjligheten att effekten förändras inte uteslutas. Det är omöjligt att med säkerhet allmänt förutspå hur resistensen eventuellt utvecklas, eftersom det här kan påverkas på många sätt allt efter odlad sort och användning. Därför svarar vi inte för skador eller förluster som en sådan resistens, som eventuellt utvecklas, försakrar. För att hjälpa minimera effekten avtagande borde den av BASF rekommenderade doseringsmängden alltid följas.

### **Första hjälpen**

Hjälppersonal bör vara uppmärksam på sin egen säkerhet. Om patienten förmodas bli medvetlös, placera och transportera i stabil sidoläge (framstupa sidoläge). Tag av förorenade kläder.

Vid inandning: Vila, frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon: Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock. Kontakta ögonläkare.

Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.

Symptom: De viktigaste kända symptom och effekter angeres under varningar och på säkerhetsdatabladet. Ytterligare viktiga symtom och effekter är hittills inte känt.

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

### **Allmänt**

Många, i synnerhet regionala eller regionalt betingade, faktorer kan påverka produktens effekt. Sådana faktorer är bl.a. väderförhållanden och jordart, olika odlingssorter, växelbruk, spruttider, doseringsmängder, blandning med andra produkter, förekomst av organismer som är resistenta mot verksamma beständsdelar samt sprutmetoden. Under vissa förhållanden kan möjligheten att effekten förändras eller växterna skadas inte uteslutas. Tillverkaren eller leverantören tar under sådana förhållanden på inget sätt ansvar för eventuella skador.

Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA har 3.3.2010 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.

# Comet® Pro



## Kasvitautien torjunta-aine

**Teohaine:** pyraklostrobinil 200 g/l w/w  
**Valmistetyyppi:** EC, emulsiokonsentraatti

**Veear:**

Haitallista nietylää.  
Haitallista hengittelylä.

Arsyttää ihoa.

Arsyttää voimakkasti silmiä.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Voi olla tapavaraa nietylää ja joutueessaan hengitysteihin.  
Eritään myrkkyllistä vesiliölle, pikkakaikaisia hartialvakuutuksia.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/sulihkeen hengittämistä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojaajista / kasvonsuojaajista.

**JOS KEMIKAAALIA ON NIELTY:** Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSITETOKSEKUUNSEEN tai lääkärin.

Ei saa oksennuttaa.

**JOS KEMIKAAALIA JOUTUU HOLLE:** Pese runsaalla vedellä ja sapuilla.

**JOS KEMIKAAALIA JOUTUU SILMÄN:** Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piloilosinti, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huutoimista.

Ota yhteys MYRKYTYSITETOKSEKUUNSEEN tai lääkärin, jos ilmenee pahoitointia.

Jos ilmenee hoitotarvista tai ihottumaa: Hakeudu lääkärin. Jos silmää-arsyts jatkuu: Hakeudu lääkärin.

Varumaton on kerätävä.

Varastoi lukituissa tilassa.

Hävitä sisältö varaarisenä jäteenä ja pakaus viemällä asianmukaisesti jätepisteeseen.

Noudata käytöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**KÄYTÄJÄRYHMÄ:** Ammattikäyttäjät: professionella.

Varastointialla: 24 mon.

Suojattava lämpötiloilta: 0 °C

Tuoteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitettuun lämpötilaan alapuolella pitempää aikojaa.

Suojattava lämpötiloilta: 40 °C

Tuoteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitettuun rajan yläpuolella pitempää aikojaa.

**Rekisterinumero:** 3053

**Luvanhaltija ja Markkinoinja:**

BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki /  
Helsingfors, puh. (09) 615 981

**Valmistaja ja pakkaaja:**

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

**Valmistusnumero ja valmistuspäivä:** katso pakkaus

**Yhteystiedot häitätapaikaksi:** 0049 180 2273 112

**Myrkytystietokeskus:** puh.: 09-471 977

5 L



## Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

**Aktiv substans:** Pyraklostrobin 200 g/l w/w  
**Preparattyp:** EC, emulsionskoncentrat

**Fara:**

Skadligt vid förtäring.

Skadligt vid inandning.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kan vara ödörligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Myclett giltig för vattenlevande organismer med längtidseffekter.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

**VID FÖRTÄRING:** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Framkalla INTE kräkning.

**VID HUDKONTAKT:** Tvätta med mycket vål och vatten.

**VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta er eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

Förvaras i låst.

Innehåller lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstäljningsplats.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, fölж bruksanvisningen.

Använd grupp: professionella.

Lagringstid: 24 md.

Skyddas mot temperaturer under: 0 °C

Skyddas mot temperaturer över: 40 °C

**Registreringsnummer:** 3053

**Registreringsinnehavare och Representation:**

BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki /  
Helsingfors, tel (09) 615 981

**Tillverkare och förpackare:**

BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany

**Batch nr och tillverkningsdag:** se förpackning.

**Nödtelefonnummer:** 0049 180 2273 112

**Giftinformationscentralen:** tel.: 09-471 977

