

Selontra®



BASF

We create chemistry

Tehokas ei-antikoagulantti jysrijämyrkkyssyötti
nopeampaan jysrijävahinkojen torjuntaan jopa
vaikeimmissä tilanteissa.

Hög presterande icke-antikoagulerings rodenticid
bete för snabb kontroll av gnagarinvärtioner, även i
de mest utmanande situationer.

Selontra® sisältää 0,75 g/kg (0,075% w/w) kolekalsiferoli. Selontra® on
BASF:n rekisteröity tavaramerkki. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina
etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Selontra innehåller 0,75 g/kg (0,075%W/W) cholecalciferol. Selontra är ett
registerat varumärke för BASF. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid
etikett och produktinformation före användning.

© = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF

3 kg

- Käyttövalmis pehmä palasyötty jysrijöitä varten / Brufsfärdig rodenticid i mjuka betesblock.
Yhdistää ainutlaatuisen, jysrijöiden nopeasti hyväksymän ja niille maittivan koostumuksen nopeasti vaikuttavaan torjuntaan – parhaimmillaan jopa viikossa. /
Kombinerar en unik, snabb accepterad och smaklig formulering med ett verkningsssätt som snabbt kontrollerar invasionen – i många fall inom en vecka.
- Torjuu antikoagulantille resistenteitä rottili, kenttämyrri ja hiirten kantoja; tehokas resistenssin katkaisija /
Kontrollerar stammer av råttor, fältsork och möss som är resistenta mot antikoaguleringsmedel: en effektiv resistensbrytare.
- Hillitsee syömistä: Selontra® jysrijämyrkin syömisen jälkeen jysrijät lopettavat syömisen nopeammin kuin antikoagulanttisyyötellä, mikä vähentää syötön menekkiä, ruuan kulutusta ja pilauantumista, omaisuuden tuhotuimutesta sekä baulien levämistä. / Sluta-ala effekt efter att ha ätit Selontra slutar gnagarna åta snabbare än med antikoaguleringsmedel, därmed minskar onödiga konsumtion av beite, konsumtion och kontaminering av livsmedel, förstörelse och spridning av sjukdomar.
- Torjuu kotihirri (*Mus musculus*), pikkuhiemishirri (*Apodemus sylvaticus*), mustarotta (*Rattus rattus*), rotta (*Rattus norvegicus*) ja kenttämyrri (*Microtus arvalis*) /
Kontrollerar husmöss (*Mus musculus*), mindre skogsmuss (*Apodemus sylvaticus*), brunrädda (*Rattus norvegicus*), svarträdda (*Rattus rattus*) och fältsork (*Microtus arvalis*)



81167375EV_FI_Selontra_IX3 KG.indd 1

Selontra®

(FIN)

Tehoaineepitoisuus:

0,075% (w/w) (puhdas kolekalsiferoli),
0,077% (w/w) (tekninen kolekalsiferoli).

20 g Käyttövalmis syötti.

Tämä valmiste sisältää karvaan maun antavaa ainetta ja väriainetta.

Vain koulutetuille ammattilaisille (käyttäjät, joilla on tuholaistorjukan tutkinto tai kasvinssuojeluainetutkinto. Kasvinssuojeluainetutkinnon suorittanut henkilö saa torjua jyrsijöitä omassa maataloustoiminnassaan.)

Lupanumero: FI-2020-0009

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso pakkaus
Viimeinen käyttöpäivä: 5 vuotta valmistuspäivästä

Yhteystiedot häätapauksissa: 0049 180 2273 112

Myrktystietokeskus: puh.: 09-471 977

Luvanhaltija:
BASF Oy, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki, Finland.

(SE)

Aktiv substans halt:

0,075% (w/w) (pur kolekalciferol),
0,077% (w/w) (teknisk kolekalciferol).

20 g Bruksfärdigt bete.

Denna produkt innehåller ett bitterämne och ett färgämne.

Enbart för specialutbildade yrkesmässiga användare
(Skadedjursbekämpare eller personer som avlagt en examen i växtskydd och som bekämpar gnagare i egen lantbruksverksamhet)

Registreringsnummer: FI-2020-0009

Batch nr och tillverkningsdag: se förpackning.
Bäst före: inom 5 år efter tillverkning.

Nödtelefonnummer: 0049 180 2273 112

Giftinformationscentralen: tel.: 09-471 977

Innehavare av produktgodkännande:
BASF Oy, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki, Finland.



4 041885 262004

® = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF

**Käyttö:**

Käytöivalmis syötti, tarkoitettu käytettäväksi kestävästä materiaalista valmistetussa syöttilaatikossa.

Vain koulutetuille ammattilaisille, syötti voidaan käyttää myös suojaissa syöttipisteissä (kunhan ne tarjoavat samantasoisen suojan muille kuin kohdelajeille ja ihmisiille, kuten kestävästä materiaalista valmistetut syöttilaatikot).

Käyttömäärä ja annosteluhleys:

Laji:	Käyttökohte:	Käyttömäärä syöttipistetti kohti:	Käyttöihes ja käytön vaatimukset:
Kotihirri (<i>Mus musculus</i>)	Sisäkäyttö ja ulkokäyttö rakennusten ympärillä	Syöttipisteitä asetetaan jyrssijöiden määrään nähden sopivasti. Kotihirret: 20 – 40 g (1 tai 2 palaa) syöttiä, 1–2 metrin välein. Pikkumetsähirrit ja kenttämyrät 40g (2 palaa) syöttiä, 1–2 metrin välein. Rotat: 100 – 140 g (5 – 7 palaa) syöttiä, 5 – 10 metrin välein.	Hyvä torjuntatulos voidaan saavuttaa 7 päivässä, jos ensimmäisenä päivänä käytetään riittävästi syöttipisteitä suhteessa jyrssijöiden määrään. Tarkista syötti 1 – 2 päivän niiden asettamisen jälkeen ja lisää uusia syöttejä syötyjen tilalle. Jos syötti on syöty kokonaan, lisää kyseiseen syöttipisteeseen suurin käytööhjeissa annettu syöttimääri. Nämä saavutetaan optimaalinen torjuntatulos mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tarkista syötti säännöllisesti (vähintään kerran viikkossa), jotta näet, onko syötti syöty ja ovatko syöttilaatikot ehjä ja jotta voit poistaa kuolleet jyrssit. Lisää syöttejä 7 päivän välein, kunnes nittiä ei enää syödä. Jos torjunnan aikana käytetään liian vähän syöttejä jyrssijöiden määrään nähden, jyrssijöiden torjunta ei onnistu kunnolla tai se kestää kauemmin. Poista jäljellä olevat syötti torjuntajakson päätyyessä.
Pikkumetsähirri (<i>Apodemus sylvaticus</i>)	Kenttämyrriä varten käyttö rajoitetaan muiille kuin maanviljelyalueille, sisätiloihin ja ulkotiloihin rakennusten ympärille ja VAIN, jos rakennusten lähellä havaitaan jyrssijöitä (jotta estetään laitteen levämisen). Ei saa käyttää avoimilla alueilla.	Käytä useampia syöttipisteitä ja maksimiyöntienmääristä alueilla, joilla on havaittu rottaa ja hiiriä. Varo käytämästä liian vähän syöttää – noudata etiketin suosituksia kussakin syöttipisteessä käytettävien syötien määrästä ja syöttipisteiden fyysisestä.	Noudata hyvin käytännön ohjeita.
Mustarotta (<i>Rattus rattus</i>)		Käytä vähemmän syöttipisteitä alueilla, joilla on vähemmän jyrssijöitä.	Koulutetut ammattilaiset: Suojaatessa syöttipisteissä. Ulkotiloissa syöttipisteet on peitettyvä ja asetettava paikkoihin, joissa muut lajit eivät liiku ja altistu syötteille.
Rotta (<i>Rattus norvegicus</i>)			Jatkava syöttys: Jatkuvassa syöttöyksessä käytetään samaa annostelua. Jatkuvaa syöttöä voidaan perustaa vain rottien sisäntuloreille ja pesimispalkoille sekä rakennusten välittömään läheisyyteen. Tarkista syötti vähintään neljän viikon välein, jotta välttetäisiin resistentin populatiori kehittymisen. Jatkuvaa syöttöä on rajoitettava pelkästään alueille, joissa jyrssijäesiintymän uusiutuminen on erittäin todennäköistä ja muut torjuntamenetelmät ovat osoittautuneet riittämättöminä.
Kenttämyrä (<i>Microtus arvalis</i>)			Jatkuvan syöttöksen strategia on tarkistettava säännöllisesti integroiduin tuholaisitorjunnan ja jyrssijäesiintymän uusiutumisen arvioinnin yhteydessä.

Käytööhjeet:

Lue valmistetiedot ja kaikki muut valmisteiden mukana tulevat tai myyntipaikassa annetut ohjeet ennen valmisteen käytämistä ja noudata niitä. Älä poista tai avaa kalvoa, jossa syötti on. Tuki torjuttava alue ennen syötien asettamista ja selvitä, mistä jyrssijäljeistä on kysymys ja missä ne liikkuvat. Selvitä mistä jyrssijöiden esiintyminen johtuu ja määritä esiintymän laajuus.

Valmistetta tulee käyttää vain osana integroitua torjuntaa, joka sisältää muun muassa hygieniatoimia ja fysisiä torjuntamenetelmiä, jos mahdollista.

Poista ravinto, joka on helposti jyrssijöiden saatavilla (esimerkiksi maahan valunettu jyvä tai ruoantähteen). Älä siirvoa käsiteltävää aluetta ennen torjuntaa, koska se häiritsee jyrssijäpopulaatiota ja vähentää syötien syömistä.

Pyrä asettamaan syöttipisteet jyrssijöiden elinrypäristöön ja ruokailupaikkojen välille. Valmiste on asettettava sellaisten paikkojen välittömään läheisyyteen, joissa on aiemmin havaittu jyrssijöitä (esimerkiksi kultureikit, pesimispalkat, paikat, jossa jyrssijät ovat ruokailleet, reilut, kolot jne.). Mikäli mahdollista, syöttilaatikot on kiinnitettyvä maahan tai muihin rakenteisiin.

Syötti on asetettava siten, ettei sitä saa pois syöttilaatikosta.

Älä laita tätä valmistetta suoraan rottien kaivamiin koloihin.

FIN

Syöttilaatikoihin on merkittävä seuraavat tiedot: "Ei saa siirtää tai avata"; "Sisältää jyrsijämärkkyä"; "Valmisteen nimi ja myyntiluvan numero"; "Tehoaine(et)" ja "Soita vaaratalanteessa myrkytystietokeskukseen".

Aseta valmiste lasten, lintujen, lemmikkieläinten, tuotantoeläinten ja muiden kuin kohteena olevien eläinten ulottumattomiin.

Aseta valmiste kauas elintarvikkeista, juomista ja eläinten rehuista sekä esineistä tai pinnioista, jotka ovat edellä mainittujen kanssa kosketuksissa.

Älä syö, juo tai tupakoi valmistetta käsitellessäsi. Pese kädet ja valmisteelle altistunut iho käytön jälkeen.

Jos syötin kulutus on vähäistä esintymän arvioituun kokoon nähden, harkitse syöttilaatikoiden paikan vaihtamista ja syötin vaihtamista koostumukseltaan toisenlaiseen valmisteeseen.

Jos syötien kulutus jatkuu 35 päivän torjuntajakson jälkeen eikä jyrsijöiden aktiivisuus näytyä vähenevän, todennäköiset syt tähdän om määritettävä. Kun muut syt on poissuljettu, jyrsijät voivat olla resistenteitä valmisteeseen. Harkitse eri valkuutusmekanismeilla toimivien jyrsijämärkkyjen käyttöä. Myös mekaanisia tai sähköisiä loukkuja voi käyttää valtohitoiliseen torjuntatolimeneen.

Jos asetat syöttilaatikota vedenpojtarjesterjelmien, kuten rännien tai viemärien, läheille, varmista, ettei syötti pääse kastumaan. Suoja syötti sääolosuhteiden vaikuttuksilta (esimerkki sateesta, lumelta jne.). Aseta syöttipisteet paikkoihin, joissa ne eivät pääse kastumaan.

Jos syöttilaatikossa oleva syötti on kostunut tai likaantunut, vaihda tilalle uusi syötti.

Jyrsijä kuolee 2–5 päivää valmisteesta tappavan annoksen syömisestä jälkeen. Jyrsijät voivat olla tauinkantajia. Älä koske kuolleisiin jyrsijöihin paljain käsin, vaan käytä suojakäsineitä tai työkaluja, kuten piitejä, niiden hävittämisenstä.

Käytä alhaisempaa syöttipisteiden määrää alueilla, joilla on vähemmän jyrsijöitä tai joilla on jatkuvia syöttöjä.

Riskinhallintatoimenpiteet:

Vaarallista luonnonvaraisilta eläimille.

Mikäli mahdollista, ilmoita torjuntatoimenpiteistä mahdollisille ohikulkijoille (esimerkiksi torjunta-alueella ja sen ympäristössä liikkuville) ennen jyrsijöiden torjuntakampanjaa.

Harkitse ehkäiseviä torjuntatoimien käytäntöä (tuki reiät, poista jyrsijöille kelpava ravinto ja juoma) valmisteen kulutuksen lisäämiseksi ja esintymän uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Jos valmistetta käytetään julkisilla paikoilla, käsitellyt alueet on merkittävä torjuntajakson aikana, ja syöttöön läheille on laitetava ilmoitus, jossa kerrotaan jyrsijämärkyn tai myrkytynneiden jyrsijöiden aiheettaan myrkytysriski ja luettelaan ensiaputoimenpiteet, joihin myrkityksien yhteydessä on ryhdyttävä.

Hävitä kuolleet jyrsijät sekäjätteenä tai poltetettavana jätteenä.

Älä pese loukkuja tai suojuatuissa syöttipisteissä käytettyjä tarvikkeita vedellä tarkastuskertojen välillä.

Älä käytä valmistetta pulssityötykkeen.

Sekundaarimyrkytyksen riskin välttämiseksi etsi kuolleet jyrsijät ja poista ne torjunnan aikana säännöllisesti hyvin käytännön oheiden mukaisesti.

Valmisteita ei saa käyttää kauppeaan kuin 35 päivää ilman torjunnan tehon arvointia [ellei ole kyse jatkuvasta syöttöyksestä].

Enslapu:

Enslapu erilaisiin hyperkalsemiaan myrkyllisillä annoksilla. Hoidettava oireenmuokkaisesti. Hoito sisältää vähäkaliumisen ruokavalion, runsaasti suolaa ja nestettä, ja auringonvalolle altistumista tulise välttää. Seerumin kalsiumsotajoen takkailua saatetaan auttaa hoiodossa. Joissakin tapauksissa on käytetty kortisonia onnistuneesti.

- Jos tarvitaan lääkinäillistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti.
- JOS KEMIKALAALIA ON HENGITETTY: Hakeudu lääkärin, jos ilmenee pahoinvointia.
- JOS KEMIKALAALIA JOUTUU IHOLLE: Hakeudu lääkärin, jos ilmenee pahoinvointia.
- JOS KEMIKALAALIA JOUTUU SILMIN: Huuhdo huollettisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista pilloinnist, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huutomista. Ota välttömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKSUKKEEN tai lääkärin.
- JOS KEMIKALAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ota välttömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKSUKKEEN tai lääkärin.

Jos lemmikkieläin nielee valmistetta, ota yhteyttä eläinlääkärin.

Hävitys:

Torjunnan päätyessä hävitä syömättä jääneet syöt varallisenen jätteenä ja tyhjä pakaus sekäjätteenä.

Säilytys:

Säilytä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmostoidussa paikassa. Pidä pakkaus suljettuna ja suojaudutaan suoralta auringonvalolta.

Säilytä erillään elintarvikkeista ja eläinten rehusta sekä tuotteista, joissa saattaa olla hajuja. Säilytä paikassa, johon lasten, lintujen, lemmikkieläinten ja tuotantoeläinten pääsy on estetty.

Säilyvyysaika: 5 vuotta.

Oikeudellinen vastuu

Tuo teemme täytävät täysin laatuvaatimukset ja takaamme niiden ainesosien pitoisuudet. Valmistaja ei ole vastuussa heehen liittyvistä vahingoista ja eikä välinnäistä vahingoista, joita johtuvat väärästä varastoinnista ja/tai valmisteen tuotteen käytöstä.

**Användningsmetod:**

Bruksfördigt bete för användning i överkantsäkra betesstationer.

Enbart för specialutbildade yrkesmässiga användare: skyddade platser för placering av bete (så länge de ger samma skyddsnivå för arter som inte är målarter och mäniskor, till exempel betesläder gjorda av hållbart material).

Appliceringsmängd och -frekvens:

Arter:	Situation:	Dosering per betesstation:	Frekvens för återbesök och krav vid användning:
<i>Mus musculus</i> (husmöss)	Inomhus och utomhus omkring byggnader	Antal platser med bete beror på mängd skadedjur där produkten används.	Bete kan endast placeras ut i 7 dagar för att uppnå kontroll, förutsatt att tillräckligt med bete för angreppet placeras ut dag 1 av behandlingen. Inspektera betet 1 – 2 dagar efter att det placeras ut och ersätt upptäckt bete. Om en betespunkt är helt förbrukad, ersätt den då med maximal mängd bete vid den betespunkten. Detta kommer säkerställa att optimal kontroll uppnås på kortast möjliga tid. Inspektera betet regelbundet (minst varje vecka) för att kontrollera om betet accepteras, betessituationerna är intakta och för bort gnagarkroppar. Fortsätt att placera ut bete var 7:e dag tills förbrukningen upphör. Observera att om otillräcklig mängd bete används under någon tidpunkt av behandlingen kan detta leda till undermåliga resultat.
<i>Apodemus sylvaticus</i> (mindre skogsmöss)	För fältsork får produkten användas utanför lantrubrugsområden, inomhus eller utomhus runt byggnader ENBART vid invasion nära byggnader (för att undvika sjukdomsspridning). Använd inte i öppna områden.	Husmöss: 20 – 40 g (1 eller 2 enheter) bete var 1 – 2 meter. Mindre skogsmöss och fältsork: 40 g (2 enheter) bete var 1 – 2 meter.	Avlägsna rester av produkten vid behandlingstidens slut. Följ alla ytterligare anvisningar som ges i relevanta riktlinjer för god praxis.
<i>Rattus norvegicus</i> (brunrädda)		Råttor: 100 – 140 g (5 – 7 enheter) bete var 5 – 10 meter.	Specialutbildade yrkesmässiga användare: Skyddade betespunkter: Vid utomhusanvändning måste betespunkterna vara täckta och placerade på strategiska platser för att minimera exponeringen för icke målorganismer. Permanent beten: Samma appliceringsfrekvens används för permanenta beten. Emellertid bör permanenta betessitället enbart finnas där skadedjurena har ingångar eller bon i direkt närhet av byggnader. Där så är möjligt rekommenderas det att den behandlade platsen besöks minst var fjärde vecka för att undvika utveckling av resistenta populationer. Permanent betningsbehandling är strikt begränsad till platser med hög potential för nya angrepp när andra metoder har visat sig otillräckliga Den permanenta betningsstrategin ska regelbundet ses över inom ramen för det integrerade bekämpningssystemet (IPM) och bedömmningen av risken för nytt angrepp.
<i>Rattus rattus</i> (svarträdda)		Använd den högre betespunktdensiteten och det maximala antalet beten där råttor och möss har setts. Var uppmärksam på om beten i förhållande till gnagare – följ rekommendationerna på etiketten gällande beteskvantitet per betespunkt och frekvensen för betespunkter.	
<i>Microtus arvalis</i> (fältsork)		Använd den lägre densiteten för betespunkter vid lättare angrepp.	

Bruksanvisning:

Läs och följ produktinformationen liksom all information som följer med produkten eller som tillhandahålls vid försäljningstillfället innan produkten används.

Ta inte bort eller öppna filmen runt betet. Genomför en förbetsundersökning av det angripa området och en bedömning på plats för att identifiera gnagararten, dess aktivitetsplatser och avgör den troliga orsaken till angreppet och dess omfattning.

Produkten får bara användas som del av ett integrerat bekämpningssystem (IPM-system), inbegripet bland annat hygienätgärder och, där så är möjligt, fysiska metoder.

Avlägsna livsmedel som är lätt att nära för gnagare (t.ex. utspilt sådeskorn eller livsmedelsavfall). Bortsett från detta, undvik att städa det angripa området direkt inför behandlingen, då detta bara stör gnagarpopulationen och gör det svårare att få dem att acceptera betet.



Försök skapa en barriär med betespunkter mellan levnads- och foderområden. Betesstationer ska placeras i ommedelbar närbete av platser där gnagaraktivitet har setts (t.ex. gångstigar, boplatser, uppfödningsplatser, hål, jordhålor osv.). Där så är möjligt måste betesstationerna fastas i marken eller i andra objekt.

Betet ska säkras så att det inte kan dras bort från betesstationen.

Applicera inte denna produkt direkt in i jordhålor.

Betesstationer måste märkas med följande information: "får inte flyttas eller öppnas"; "innehåller rodenticid"; "produktnamn eller registreringsnummer"; "verksamt ämne eller verksamma ämnem" och "vid olycksfall, kontakta giftinformationscentralen".

Placerera produkten oåtkomligt för barn, fåglar, sällskapsdjur, livsmedelsproducerande djur och andra djur som inte produkten är avsedd för.

Placer produkten åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder, samt från föremål eller ytor som kommer i kontakt med dessa.

Undvik att äta, dricka och röka när du använder produkten. Tvätta händerna och direktreponderad hud efter användning av produkten.

Vid liten åtgång av bete jämfört med angreppets synbara storlek, överväg att flytta betesstationerna till anna platser och att eventuellt byta till en annan betesställen.

Om beten fortsätter att förtäras efter 35 dagars behandling och ingen nedgång ses i gnagaraktiviteten måste den troliga orsaken bestämmas. När andra faktorer har uteslutits, överväg användning av en rodenticid med annat verkningsätt. Överväg även att använda fallor som en alternativ åtgård.

Vid placering av betesstationer nära vattendräningsystem, se till att kontakt mellan betet och vattnet undviks. Skydda betet mot vädermässiga faktorer (t.ex. regn, snö, osv.). Placer betesstationerna på platser som inte riskerar att översvämmas. Ersätt allt bete i en betesstation (eller för enbart specialutbildade yrkesmässiga användare, platser för placering av bete) där betet har skadats av eller förorenats av smuts.

Gnagarna kommer att dö inom 2 – 5 dagar efter förtäring av en dödlig mängd bete. Gnagare kan vara sjukdomsbärare. Vridrör inte döda gnagare med bara händer, utan använd handskar eller verktyg såsom tång när du bortskaffar dem.

Använd den lägre densiteten för betespunkter vid lättare angrepp eller vid permanenta beten av utbildade proffs.

Riskreducerande åtgärder:
Farligt för miljön och djurlivet.

Där så är möjligt, informera berörd allmänhet före behandlingen (t.ex. de som använder den behandelnde platsen och dess omgivning) om gnagarbekämpningen [i enlighet med eventuella tillämpliga riktlinjer för god praxis]

Överväg förebyggande åtgärder (läpp igen hål, avlägsna potentiella livsmedel och drycker så långt möjligt) för att förbättra produktintaget och minska risken för nya angrepp.

När produkten används på offentliga platser ska platserna märkas under behandlingstiden och ett meddelande sättas upp intill betet som förklarar risken för primär eller sekundär förgiftning av rodenticiden och som anger de första åtgärderna att vidta vid förgiftning.

Gör dig av med döda gnagare som blandavfall eller brännavfall.

Rengör inte betesstationer (eller för specialutbildade yrkesmässiga användare verktyg som används i täckta eller skyddade betespunkter) med vatten mellan applikationerna.

Använd inte produkten för pulsbehandlingar.

För att minskas risken för sekundär förgiftning, sök efter och avlägna döda gnagare regelbundet under behandlingen, i linje med rekommendationerna i relevanta riktlinjer för god praxis.

Produkten får inte användas längre tid än 35 dagar utan att angreppets omfattning och behandlingseffekt utvärderas [om inte godkänt för permanenta betesställen].

Första hjälpen:

Kolekalcerol orsakar hyperkalceri vid giftiga doseringar. Behandla symptomatiskt. Behandling skulle omfatta en kalciomsnål kost, stort salt- och vätskeintag och att undvika exponering mot solen. Att övervaka serumkaliumnivåer kan bidra till behandlingen. Kartosin har använts med framgång i en del fall.

- Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- VID INANDNING: Sök läkarhjälp vid obehag.
- VID HUDKONTAKT: Sök läkarhjälp vid obehag.
- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
- VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Kontakta veterinär om ett sällskapsdjur får i sig produkten.

Bortskaffning:

Vid avslutad behandling ska överblivet bete kastas som farligt avfall och förpackningen kastas som blandavfall.

Förvaring:
Förvaras på en torr, sval och välventilerad plats. Förvara förpackningen stängd och skyddad från direkt solljus.

Förvara bortom livsmedel och djurfoder och produkter som kan dofta. Förvaras oåtkomligt för barn, fåglar, sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur.

Hållbarhet: 5 år

Rättslig ansvar

Produkten uppfyller kvalitetskraven. Vi garanterar produktens sammansättning. Tillverkaren är inte ansvarig för bristande effekt eller skador, inklusive förläckningar, som uppkommit på grund av att rekommendationer för lagring och användning inte följs.